

Suicidio en adolescentes, una problemática que se agudizó con la pandemia

utpl
09/03/2022

Categorías:
Futuros alumnos, Investigación, UTPL

El distanciamiento social a causa de la pandemia por el covid-19 permitió desarrollar grandes avances en materia de tecnología y conectividad digital, pero también provocó que se agudizaran problemáticas sociales que de forma previa, ya eran consideradas problemas de salud pública, como el suicidio.

A escala global, cada año, más de 700.000 personas se **quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos**, según datos de la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#) [1]. En Ecuador, esta problemática tiene una gran incidencia y afecta en gran medida, a los adolescentes.



El suicidio es considerado en el país como la principal causa de muerte en menores entre 12 y 17 años.

[Aránzazu Cisneros Vidal](#) [2], directora de la [maestría en Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud](#) [3] de la [Universidad Técnica Particular de Loja \(UTPL\)](#). [4] indica que esta problemática registró un incremento en 2019, llegando a contabilizarse 1.214 suicidios por año. Esto significa que se **produjeron entre 2 y 3 suicidios en adolescentes cada día. Con la llegada de la pandemia, menciona que esta situación se agravó, aunque todavía no existen cifras que permitan dimensionarla.**

Para la catedrática, el **suicidio en adolescentes se debe a factores económicos, sociales, académicos, de socialización**, entre otros; por lo que el aislamiento ha provocado que los menores de edad cuenten con menos espacios para expresar sus emociones y comunicar las dificultades que enfrentan a diario. Por ello, resalta la importancia de la prevención.



No ignore las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes.

Estrategias de prevención

[Cisneros](#) [2] menciona que todavía **existen muchos desafíos en Ecuador en materia de salud mental y, en especial, en prevención del suicidio**. De acuerdo con información, recopilada por el [Observatorio de Salud Mental y Drogas \(OBASTAL\)](#) [5] de la [UTPL](#) [4], la mayoría de casos son tratados por las circunstancias. Es decir, cuando ya hubo un intento de suicidio.

En este sentido, la catedrática menciona tres estrategias importantes de prevención:

1. Monitoreo	Después de un reciente estudio presentaban
2. Atención integral	La prevención del suicidio importante. Esto permite garantizar
3. Protocolo	El diseño de protocolos es clave en la conversación

Decide ser más

Si deseas convertirte en un profesional competente para el diseño, implementación y evaluación de programas dirigidos a la promoción de la salud mental, y el diseño, aplicación y evaluación de tratamientos de casos clínicos, elige la [Maestría en Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud](#): [3] utpl.edu.ec/maestrias/psicologiaclinica [6]

Source URL: <https://noticias.utpl.edu.ec/suicidio-en-adolescentes-una-problematica-que-se-agudizo-con-la-pandemia>

Links

- [1] <https://www.who.int/es>
- [2] <https://investigacion.utpl.edu.ec/es/macisneros>
- [3] <https://utpl.edu.ec/maestrias/psicologiaclinica>
- [4] <https://www.utpl.edu.ec/>
- [5] <https://vinculacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obastal>
- [6] <https://www.utpl.edu.ec/maestrias/psicologiaclinica>